

ANTI-STONE

(Film-Coated Tablets)

Composition & Excipients:

Each ANTI-STONE film-coated tablet contains the following powders and herbal extracts:

Extracts: *Didymocarpus pedicellata*: 130 mg, *Saxifraga ligulata*: 98 mg, *Rubia cordifolia*: 32 mg, *Cyperus scariosus*: 32 mg, *Achyranthes aspera*: 32 mg, *Onosma bracteatum*: 32 mg, *Vernonia cinerea*: 32 mg.
Powders: Shilajeet Purified: 26 mg, and Hajrul yahood Bhasma: 32 mg.

Processed in: *Ocimum basilicum*, *Dolichos biflorus*, *Tribulus terrestris*, *Mimosa pudica*, *Pavonia odrata*, *Equisetum arvense*, *Tectona grandis seed*.

Excipients: Microcrystalline cellulose, HPMC, Aerosil, Magnesium stearate, Ethyl cellulose, Titanium dioxide, Talc, Propylene glycol, Iron oxide yellow.

Pharmacotherapeutic group: Lithotryptic (disintegrate renal and urinary calculi), urinary antiseptic.

Mechanism of Action:

ANTI-STONE prevents supersaturation of lithogenic substances, controls oxamides (a substance that precipitates stone formation) absorption from the intestine and corrects the crystalloid-colloid imbalance. ANTI-STONE inhibits calculogenesis by reducing stone forming substances like oxalic acid, calcium hydroxypyroline, etc., and causes their expulsion by micropulverization. ANTI-STONE causes disintegration of the calculi and the crystals by acting on the mucin, which binds the particles together. ANTI-STONE's antimicrobial activity is beneficial in the prevention of urinary tract infections associated with urinary stones and crystalluria. ANTI-STONE's antispasmodic and anti-inflammatory activities relieve ureteric colic and alleviate symptoms of painful and burning micturition.

Indications:

1. Urolithiasis:
 - oxalate stones.
 - phosphate stones.
 - urate stones and uric acid salts.
 - crystalluria.
 - mixed crystals.
 - glycolic acids.
 - prevent recurrence after surgery.
2. As an adjuvant in:
 - urinary tract infections.
 - urinary tract infections during pregnancy.
 - non-specific urethritis.
 - cystitis, pyelitis.
 - burning micturition.
 - gout and hyperuricemia.
3. Urinary incontinence in women.
4. Sialolithiasis.



Contraindications:

There are no absolute contraindications.

Dosage:

Urolithiasis and crystalluria: 2 tablets twice daily. Therapy should be continued till the macroscopic and radiographic evidence of expulsion of calculus is obtained.

Urinary infections: 2 tablets twice daily, for 1 to 2 weeks, followed by 1 tablet twice daily till the patient feels asymptomatic.

Burning micturition: 1 tablet thrice daily, till the symptoms subside.

Prophylaxis after surgical intervention: 1 tablet twice daily for 2 to 3 months.

Precautions: It is advisable not to be recommended in obstructive uropathy due to larger stones.

Adverse effects: None.

Drug interactions: None.

Special warnings: None.

Undesirable Effects: None.

Packaging:

3 blisters (Aluminium/Aluminium), each contains 10 film-coated tablets/carton box.

Storage Conditions:

Keep out of reach of children
Store in a dry place, below 25° C, away from direct sunlight.
Do not refrigerate.

TPP1800000	THIS IS A MEDICAMENT
<ul style="list-style-type: none">- A medicament is a product but unlike any other products.- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.	
KEEP MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN (Council of Arab Health Ministers) (Arab Pharmacists Association)	

Manufactured by:
HAMA PHARMA Hama - Syria
Tel.: +963 33 8673941 Fax: +963 33 8673943





مضادات الاستطباب: لا يوجد.

الجرعة:

حالات تحصي البول والبيلة البلورية: ٢ قرص مرتين يومياً، وتبغى مواصلة العلاج حتى يتم الحصول على الأدلة العيانية والإشعاعية للتخلص من الحيات.

الأخماج البولية: ٢ قرص مرتين يومياً، من ١-٢ أسبوع، يليها ١ قرص مرتين يومياً حتى يشعر المريض بزوال الأعراض.

حرقة البول: ١ قرص ثلاث مرات يومياً، حتى تهدأ الأعراض.

الوقاية بعد التدخل الجراحي: قرص واحد مرتين يومياً لمدة ٢ إلى ٣ أشهر.

الاحتياطات:

من المنصوح به عدم الاستخدام في حالة الاعتلال البولي الانسدادي بسبب الحصيات الكبيرة.

التأثيرات الجانبية: لا يوجد.

التداخلات الدوائية: لا يوجد.

تحذيرات خاصة: لا يوجد.

تأثيرات غير مرغوبة: لا يوجد.

التعبئة:

عبوة من الكرتون تحوي بليستر (المنيوم/ألنسيوم) عدد (٣).

وكل بليستر يحوي ١٠ أقراص ملبسة بالفيلم.

شروط الحفظ:

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

يحفظ في مكان جاف، أقل من ٢٥°م، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

لا يجوز وضع المستحضر في البراد.

أنتي-ستون

(أقراص ملبسة بالفيلم)

التركيب والسواغات:

يحوي كل قرص ملبس بالفيلم من أنتي - ستون على تركيبة نباتية هندية مبنية في النشرة الإنكليزية.

السواغات: ميكروكربونات سللوز وهيدروكسي بروبيل مثيل سللوز وإپوزيل وستيرات المغنزيوم، إيتيل سللوز، تالك، ثاني أكسيد التيتانيوم، بروبيلين غليكول، أكسيد الحديد الأصفر.

الزمرة الدوائية العلاجية: مفتت حصى (يقوم بتفتيت الحصيات الكلوية والبولية)، مطهري بولي.

آلية العمل:

يمنع أنتي - ستون التشبع الفائق من المواد الحصوية، ويضبط امتصاص الأوكساميدات (المادة التي تعجل تشكيل الحصيات) من الأمعاء، ويصحح الاختلال البولي-الغرويدي. يثبط أنتي - ستون تكون الحصيات عن طريق الحد من المواد التي تشكل الحصى مثل حمض الأوكزاليك، والكالسيوم هيدروكسي بيروكسين وغيرها، ويسبب التخلص منها عن طريق السحق الميكروي. يسبب أنتي - ستون تفتيت الحصيات والبولورات من خلال العمل على الميوسين، الذي يربط الجزيئات مع بعضها. تفيد الفعالية المضادة للجراثيم لأنتي - ستون في الوقاية من التهابات المسالك البولية المرتبطة بالحصيات البولية والبيلة البلورية. كما الفعالية المضادة للتشنج والمضادة للالتهابات لأنتي - ستون في تخفيف مغص الحالب والتخفيف من الأعراض المؤلمة وحرقة البول ..

الاستطبابات:

١- حصيات المسالك البولية:

- حصيات الأوكزالات.
- حصيات الفوسفات.
- حصيات البولة وأملاح حمض البول.
- البيلة البلورية.
- البولورات المختلطة.
- حمض الغليكوليك.
- منع النكس بعد الجراحة.

٢- كعامل مساعد في:

- التهابات المسالك البولية.
- التهابات المسالك البولية أثناء الحمل.
- التهاب الحالب غير المحدد.
- التهاب المثانة، التهاب الحويضة.
- حرقة البول.
- القرقرس وفرط حمض البول في الدم.

٣- سلس البول في النساء.

٤- التحصي العلابي.

TPP1800000	إن هذا دواء
<p>- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.</p> <p>- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.</p> <p>- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عامتها، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك، فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وقصده وضرره.</p> <p>- لا تقطع صدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك.</p> <p>- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.</p>	
(مجلس وزراء الصحة العرب)	لا تترك الأدوية أبداً في متناول أيدي الأطفال (الجماعة الصيدلانية العرب)

إنتاج:

حماء فارما حماه - سورية

هاتف: +٩٦٣ ٢٢ ٨١٧٣٩٤١ فاكس: +٩٦٣ ٢٢ ٨١٧٣٩٤٣





أنتي-ستون

(أقراص ملبسة بالفيلم)

التركيب والسواغات:

يحوي كل قرص ملبس بالفيلم من أنتي-ستون المساحيق والحاصلات التالية:
الخلاصات: ديديموكاربوس بيديسيلانا ١٣٠ ملغ، كاسر الحجر ٩٨ ملغ، الفوة ٣٢ ملغ، السعد ٣٢ ملغ، سهم الراعي ٣٢ ملغ، لسان الثور ٣٢ ملغ، الغبرونية الرمادي ٣٢ ملغ.
المساحيق: القير المنقى ٢٦ ملغ، هاجرول ياهود باسم ٣٢ ملغ.
مصنعة بوجود أبخرة النباتات التالية: الريحان، اللوبيا ثنائية الأزهار، الحسك، المستحية، يوفينيا العطرية، ذنب الخيل، بذر خشب شجرة الساج.
السواغات: ميكروكريستالين سللوز وهيدروكسي بروبيل مثل سللوز وإيروزيل وستيرات المغنسيوم، إيتيل سللوز، تالك، ثاني أكسيد التيتانيوم، برويلين غليكول، أكسيد الحديد الأصفر.

الزمرة الدوائية العلاجية: مفتت حصى (يقوم بتفتيت الحصى الكلوية والبولية)، مطهر بولي.

آلية العمل:

يمنع أنتي - ستون التشبع الفائق من المواد الحصوية، ويضبط امتصاص الأوكساميدات (المادة التي تعجل تشكيل الحصىات) من الأمعاء، ويصحح الاختلال البولوي-الغرويدي. يبط أنتي - ستون تكون الحصىات عن طريق الحد من المواد التي تشكل الحصى مثل حمض الأوكزاليك، والكالسيوم هيدروكسي بربولين وغيرها، ويسبب التخلص منها عن طريق السحق الميكروي. يسبب أنتي-ستون تفتيت الحصىات والبولوات من خلال العمل علي الميوسين، الذي يربط الجزيئات مع بعضها. تفيد الفعالية المضادة للجراثيم لأنتي - ستون في الوقاية من التهابات المسالك البولية المرتبطة بالحصىات البولية والبييلة البلورية. كما الفعالية المضادة للتشنج والمضادة للالتهابات للأنتي - ستون في تخفيف مغص الحالب والتخفيف من الأعراض المؤلمة وحرقة البول ..

الاستطبابات:

١- حصىات المسالك البولية:

- حصىات الأوكزالات.
- حصىات الفوسفات.
- حصىات البولة وأملاح حمض البول.
- البييلة البلورية.
- البولوات المختلفة.
- حمض الغليكوليك.
- منع النكس بعد الجراحة.

٢- كإكمال مساعد في:

- التهابات المسالك البولية.
- التهابات المسالك البولية أثناء الحمل.
- التهاب الحالب غير المحدد.
- التهاب المثانة، التهاب الحوضية.
- حرقة البول.
- النفرس وقرط حمض البول في الدم.

٣- سلس البول في النساء.

٤- التحصي المعالي.

مضادات الاستطباب: لا يوجد.

الجرعة:

حالات تحصي البول والبييلة البلورية: ٢ قرص مرتين يومياً. وينبغي مواصلة العلاج حتى يتم الحصول على الأدلة العيانية والإشعاعية للتخلص من الحيات.

الأخماج البولية: ٢ قرص مرتين يومياً، من ١-٢ أسبوع، يليها ١ قرص مرتين يومياً حتى يشعر المريض بزوال الأعراض.

حرقة البول: ١ قرص ثلاث مرات يومياً، حتى تهدأ الأعراض.

الوقاية بعد التدخل الجراحي: قرص واحد مرتين يومياً لمدة ٢ إلى ٣ أشهر.

الاحتياطات:

من المنصوح به عدم الاستخدام في حالة الاعتلال البولوي الانسدادي بسبب الحصىات الكبيرة.

التأثيرات الجانبية: لا يوجد.

التداخلات الدوائية: لا يوجد.

تحذيرات خاصة: لا يوجد.

تأثيرات غير مرغوبة: لا يوجد.

التعبئة:

عبوة من الكرتون تحوي بليستر (ألنسيوم /ألنسيوم) عدد (٣)،

وكل بليستر يحوي ١٠ أقراص ملبسة بالفيلم.

شروط الحفظ:

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

يحفظ في مكان بارد وجاف، أقل من ٢٥م، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

لا يجوز وضع المستحضر في البراد.

TPP1800000	إن هذا دواء
-	الدواء مستحضر ولكن ليس كثيره من المستحضرات.
-	الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
-	اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك، فالطبيب والصيدلاني هما اللذان هما المسؤولان عن وضعه وضوره.
-	لا تلتقط مدة العلاج المحدد من لقاء نفسك.
-	لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
لا تترك الأدوية أبداً في متناول أيدي الأطفال (مجلس وزراء الصحة العربي) (مجلس الصيدالنة المصري)	

إنتاج:

حماه فارما حماه - سورية

هاتف: +٩٦٣ ٢٣ ٨٦٧٩٤١ فاكس: +٩٦٣ ٢٣ ٨٦٧٩٤٢



ملاحظة هذه النسخة قبل التعديل خوفاً من

التراجع