

# FEM-RELIEVE (film-coated tablets)

Paracetamol 500 mg + Pamabrom 25 mg



## COMPOSITION AND EXCIPIENTS:

Each film-coated tablet of Fem-Relieve contains:

Paracetamol 500 mg  
Pamabrom 25 mg

**Excipients:** Magnesium Stearate, Corn Starch, Sodium Starch Glycolate, Microcrystalline Cellulose, Hypromellose, Titanium Dioxide, Polydextrose, Polyethylene Glycol.

## INDICATIONS :

for the temporary relief of these symptoms associated with menstrual periods:

- headache
- bloating
- cramps
- backache
- muscular aches
- irritability
- water-weight gain

## WARNINGS:

### Liver warning:

Fem-Relieve contains Paracetamol. Severe liver damage may occur if you take:

- more than 4,000 mg in 24 hours, which is the maximum daily amount.
- With other drugs containing Paracetamol.
- 3 or more alcoholic drinks every day while using this product.

### Allergy alert:

Paracetamol may cause severe skin reactions.

Symptoms may include: skin reddening ,blisters ,rash.

If a skin reaction occurs, stop use and seek medical help right away.

### Do not us:

- with any other drug containing Paracetamol (prescription or nonprescription).

If you are not sure whether a drug contains Paracetamol, ask a doctor or pharmacist.

if you have ever had an allergic reaction to this product or any of its ingredients.

### As k a doctor before use if you have:

- difficulty in urination due to enlargement of the prostate gland
- a breathing problem such as emphysema or chronic bronchitis
- liver disease
- glaucoma

### As k a doctor or pharmacist before use if you are:

- taking sedatives or tranquilizers.

- taking the blood thinning drug warfarin.

## When using this product

- you may get drowsy.
- avoid alcoholic beverages.
- excitability may occur, especially in children.
- alcohol, sedatives and tranquilizers may increase drowsiness.
- use caution when driving a motor vehicle or operating machinery.

## Stop use and ask a doctor if:

- pain gets worse or lasts more than 10 days.
- new symptoms occur.
- redness or swelling is present

These could be signs of a serious condition.

## DIRECTIONS FOR USE:

Do not take more than the recommended dose.

Adults and children 12 years and over: take 2 tablets with water every 6 hours as needed.

Do not exceed 8 tablets in a 24 hour period or as directed by a doctor

children under 12 years: ask a doctor.

## STORAGE CONDITIONS:

Store at room temperature, below 30°C, away from light, moisture and excessive heat.

## PACKAGING:

(1) or (3) blisters , each contains 10 film-coated tablets/ carton box.

### THIS IS A MEDICAMENT

- A medicament is a product but unlike any other products.
- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

### KEEP MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN

(Council of Arab Health Ministers)

(Arab Pharmacists Association)

Manufactured by:  
HAMA PHARMA Hama - Syria  
Tel.: +963 33 8673941 Fax: +963 33 8673943



# فام- ريليف (أقرص ملبسة بالفيلم)

باراسيتامول ٥٠٠ ملغ + بامابروم ٢٥ ملغ

## التكوين و السواغات:

يحتوي كل قرص ملبس بالفيلم من فام-ريليف على :

باراسيتامول ٥٠٠ ملغ

بامابروم ٢٥ ملغ

**السواغات:** شمعات المغنيزيوم، نشاء الذرة، غليكولات النشاء الصودي، سيللوز فائق النعومة، هيبروميلوز، ثاني أكسيد التيتانيوم، بولي ديكتروز، بولي إيثيلين غليكول .

## الاستنباطات:

للتخفيف المؤقت من هذه الأعراض المرتبطة بفترات الحيض:

• الصداع

• الانتفاخ

• معصات

• آلام الظهر

• الأوجاع العضلية

• التهيج

• زيادة الوزن بسبب احتباس السوائل

## التحذيرات:

### التحذير الكبدى:

يحتوي فام-ريليف على باراسيتامول. قد يحدث تلف الكبد الشديد إذا كنت تأخذ:

• أكثر من ٤٠٠٠ ملغ في ٢٤ ساعة ، وهو الحد الأقصى للكمية اليومية

• أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول.

• ٣ أو أكثر من المشروبات الكحولية كل يوم أثناء استخدام هذا المنتج.

### تنبيه الحساسية:

قد يسبب الباراسيتامول ردود فعل جلدية شديدة.

قد تشمل الأعراض: احمرار الجلد ، بثور و طفح جلدي.

في حالة حدوث رد فعل جلدي ، توقف عن الاستخدام واطلب المساعدة الطبية على الفور.

### لا تستخدمه:

مع أي دواء آخر يحتوي على باراسيتامول (بوصفة طبية أو من دون وصفة طبية).

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان الدواء يحتوي على عقار الباراسيتامول ، اسأل الطبيب أو الصيدلي.

إذا كان لديك أي رد فعل تحسسي لهذا المنتج أو أي من مكوناته.

**اسأل الطبيب قبل الاستخدام في حال كان لديك :**

• صعوبة في التنفس بسبب تضخم غدة البروستات.

• مشكلة في التنفس مثل انتفاخ الرئة أو التهاب الشعب الهوائية المزمن

• مرض كبدى

• الزرق

**اسأل الطبيب أو الصيدلي قبل الاستخدام إذا كنت:**

• تتناول المرنكات أو المهدئات.

• تستخدم الوارفارين .

## عند استعمال هذا المنتج:

• قد تصاب بالنعاس

• تجنب المشروبات الكحولية

• قد يحدث استنزائية ، خاصة عند الأطفال

• الكحول و المرنكات و المهدئات قد تزيد من النعاس

• توخي الحذر عند قيادة السيارة أو تشغيل الآلات

## التوقف عن الاستخدام و سؤال الطبيب إذا:

• زاد الألم أو استمر أكثر من ١٠ أيام

• حدوث أعراض جديدة

• وجود احمرار أو تورم

• هذه يمكن أن تكون علامات لحالة خطيرة.

## تعليمات الاستخدام:

لا تأخذ أكثر من الجرعة الموصى بها.

**البالغون و الأطفال ١٢ سنة فأكثر:** تناول ٢ قرص مع الماء كل ٦ ساعات حسب الحاجة.

لا تتجاوز ٨ أقرص في فترة ٢٤ ساعة أو حسب توجيهات الطبيب.

**الأطفال دون سن ١٢ سنة:** اسأل الطبيب.

## شروط الحفظ :

يحفظ بدرجة حرارة الغرفة، أقل من ٣٠ ° م ، بعيداً عن الضوء و الرطوبة و الحرارة الزائدة.

## التعبئة:

علبة من الكرتون تحوي بلستر عدد (١) أو (٣) ، و كل بلستر يحوي ١٠ مضغوطات ملبسة بالفيلم.

### إن هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كثيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك. فالتبيب و الصيدلاني هما الخبيران بالدواء وفعله وضرره.
- لا تطعم مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك.
- لا تتكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.

لا تتروك الادوية ابدًا في متناول ايدي الأطفال  
(مجلس وزراء الصحة المصري)

إساج:

حماة فارما حماة - سورية

هاتف: +٩٦٣ ٢٢ ٨١٧٢٩٤١ فاكس: +٩٦٣ ٢٢ ٨١٧٢٩٤٢

