

- HAMAPHARMA/LEAF/FERULA-Z size (98 x160 mm)

- Create 7.6.2018/T27.6.2018/F16.7.2018/T20.4.2019

FERULA-Z Capsules (Pellets)



Composition: Each FERULA-Z capsule (Pellets) contains:

Ferrous Fumarate 200mg (Elemental iron 65 mg), zinc sulphate monohydrate 61.8 mg (Elemental Zinc 22.5 mg), Folic acid 1.5 mg, Cyanocobalamine 15 mcg.

Excipient: Pellets ready for filling.

Indications: Treatment of iron deficiency anemia and other anemias eg, megaloblastic anemia. Treatment of zinc deficiency, which may occur especially during pregnancy.

Folic acid is also used to prevent neural tube birth defects. Increased requirement of folate in the body during pregnancy. Folate deficiency

Contraindications: Hypersensitivity to any of the components of the product. Hemochromatosis and hemosiderosis.

Side Effects: Constipation, Dark or green stools, Diarrhea, Loss of appetite, Nausea, Stomach cramps. Allergic reactions.

Special Precautions: Folic acid in doses > 0.1 mg daily may obscure pernicious anemia in that hematologic remission can occur while neurological manifestations remain progressive.

Those with elevated serum ferritin levels should be extremely cautious in the use of iron supplements. Iron supplements can be highly toxic or lethal to small children. Iron supplements should be used with extreme caution in those with chronic liver failure, alcoholic cirrhosis, chronic alcoholism and pancreatic insufficiency.

Ferrous Fumarate requires adequate stomach acid for absorption. Therefore, Ferrous Fumarate should be taken with food and should not be used with antacids. Iron should be used with caution in patients with a history of gastritis, peptic ulcer disease or gastrointestinal bleeding.

Drug Interactions:

Folic Acid:

Drugs which may cause folate deficiency include phenytoin, isoniazid, primidone, barbiturates, oral contraceptives, ethanol, sulfasalazine, cycloserine, glutethamide, methotrexate, pyrimethamine, trimethoprim and triamterene.

Zinc interferes with captopril, tetracycline antibiotics absorption, thiazide and potassium-sparing diuretics. It decreases the absorption and effectiveness of fluoroquinolones antibiotics (Ciprofloxacin, Levofloxacin).

Iron supplement:

Acid Pump Inhibitors: Lansoprazole, omeprazole, pantoprazole, rabeprazole.

Antacids: Aluminum- or magnesium-containing antacids.

Bisphosphonates: Alendronate, etidronate, risedronate.

H2-Blockers: Cimetidine, famotidine, nizatidine, ranitidine.

Quinolones: Ciprofloxacin, gatifloxacin, levofloxacin, lomefloxacin, moxifloxacin, norfloxacin, ofloxacin, sparfloxacin, trovafloxacin.

Dosage & Administration: One capsule daily, or as directed by the doctor.

Overdosage: Symptoms of Ferrous Fumarate overdose include decreased energy; nausea, vomiting, abdominal pain; tarry stools; a weak, rapid pulse, fever; coma; seizures and death.

Symptoms of zinc sulfate overdose include nausea, severe vomiting, dehydration and restlessness.

Packing: 2 blisters, each blister contains 10 extended-release capsules/carton box.

Storage Conditions:

Store at room temperature, not exceeding 30° C.

Keep out of reach of children.

TPP1801373	THIS IS A MEDICAMENT
- A medicament is a product but unlike any other products. - A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you. - Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks. - Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you. - Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.	
KEEP MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN	
(Council of Arab Health Ministers) (Arab Pharmacists Association)	

Manufactured by:

HAMA PHARMA Hama - Syria

Tel.: +963 33 8673941 Fax: +963 33 8673943





فيرولا Z كبسول (حبيبات)

التركيب الكيميائي: تحوي كل كبسولة (حبيبات) فيرولا-Z:

فومارات الحديدية ٢٠٠ ملغ (٦٥ ملغ حديد).

سلفات الزنك مونوهيدرات: ٦١,٨ ملغ (٢٢,٥ ملغ زنك).

حمض الفوليك: ١,٥ ملغ.

سيانوكوبالامين: ١٥ ميكروغرام.

السواغات: حبيبات جاهزة للتعبئة.

الاستطبيات: يستخدم لعلاج فقر الدم بعوز الحديد وحالات فقر الدم الأخرى على سبيل المثال، فقر الدم الضخم الأرومات (بسبب نقص حمض الفوليك). كما يستخدم لعلاج نقص الزنك، الذي قد يحدث بخاصة خلال فترة الحمل. كما يستخدم حمض الفوليك لمنع عيوب الأيوب العصبي عند الولادة.

مضادات الاستطبيات: فرط الحساسية لأي من مكونات المستحضر. حصد الدم وصباغ الدم.

التأثيرات الجانبية: إسهال، براز أسود أو اخضر، إسهال، فقدان الشهية، غثيان، معصات بطنية، تفاعلات تحسسية.

احتياطات خاصة: قد يحجب حمض الفوليك بجرعات < ٠,١ ملغ يومياً فقر الدم الخبيث بحيث يمكن أن يحدث الشفاء الدومي بينما لا تزال المظاهر العصبية متطورة. يجب الحذر للغاية عند استخدام مكملات الحديد عند ازدياد مستويات فريتئين المصل. يمكن أن تكون مكملات الحديد شديدة السمية أو قاتلة للأطفال الصغار. ينبغي استخدام مكملات الحديد مع الحذر الشديد في المرضى المصابين بفشل كبد مزمن، تليف كبد كحولي، إدمان الكحول المزمن وقصور البنكرياس.

تتطلب فومارات الحديدية حموضة معدة كافية للاصتصاص، ولذلك، ينبغي أن يؤخذ مع الغذاء ولا ينبغي أن يستخدم مع مضادات الحموضة. ينبغي استخدام الحديد بحذر في المرضى الذين لديهم تاريخ لالتهاب معدة، قرحة معدية أو نزيف في الجهاز الهضمي.

التداخلات الدوائية:

حمض الفوليك:

تشمل الأدوية التي يمكن أن تسبب عوز الفولات: الفينيتوين، الأيزونيازيد، البريميديون، الباريتورات، مانعات الحمل الفموية، الإنابول، السلفاسالازين، السيكلوسيرين، الغلوتيثاميد، الميثوتريكسات، بيريميثامين، تري ميثوريم وتريمترين.

الزنك يتداخل مع امتصاص الكابتوبريل، المضادات الحيوية التتراسيكلينية، المدرات المثابذية والمدرات الحافظة لليوتاسيوم. وهي تقلل من امتصاص وفعالية المضادات الحيوية من زمرة فلوروكينولونات (مثل سيبروفلوكساسين و ليفاكوين).

مكملات الحديد:

مشطات مضخة البروتين: لانزوبازول، اوميبازول، بانتوبرازول، رابيزازول.

مضادات الحموضة: مضادات الحموضة التي تحتوي على الألمنيوم أو المغنيزيوم.

البروفوسفونات: البندرونات، ايتندرونات، ريسيدرونات.

حاصرات H2: سيميتيدين، فاموتيدين، نيزاتيدين، رانيتيدين.

الكينولونات: السيبروفلوكساسين، الغاتيفلوكساسين، الليفوفلوكساسين، اللوميفلوكساسين، الموكسيفلوكساسين، التروفلوكساسين، الأوفلوكساسين، السبارفلوكساسين، تروفلوكساسين.

الجرعة وطريقة الاستعمال: كبسولة واحدة يومياً، أو كما يشار من قبل الطبيب.

فرط الجرعة: تشمل أعراض فرط الجرعة من فومارات الحديدية انخفاض الطاقة، غثيان، إقياء، ألم بطني؛ نبض ضعيف وسريع، حمى؛ غيبوبة؛ نوبات صرعية وموت.

تشمل أعراض فرط الجرعة من سلفات الزنك الغثيان، الإقياء الشديد، والتقيح وتعملل.

التعبئة: علب من الكرتون تحوي شريطي بلايستر، وكل شريط يحوي ١٠ كبسولات.

شروط التخزين: يحفظ في درجة حرارة الغرفة، لا تتجاوز ٣٠°م.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

إن هذا دواء
TPP1801373
- الدواء مستحضر ولكن ليس كثيره من المستحضرات
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك، فالخطيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وضعه وصرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
لا تترك الأدوية أبداً في متناول أيدي الأطفال (مجلس وزراء الصحة العربي)
(الحصص الصيدلانية العربي)



إنتاج: حماة فارما حماة - سورية

هاتف: ٩٦٢٣٣٨١٧٣٩٤١ فاكس: ٩٦٢٣٣٨١٧٣٩٤٣