

IMPROMOOD SR (Sustained-Release Capsules)

Amitriptyline Hcl 25 mg

COMPOSITION & EXCIPIENTS:

Each capsule contains Amitriptyline Hcl (as sustained-release pellets) 25 mg .

Excipients : pellets.

INDICATIONS:

Impromood SR is used to treat:

- Depression in adults (major depressive episodes)
- Neuropathic pain in adults
- Chronic tension type headache prophylaxis in adults
- Migraine prophylaxis in adults
- Bed-wetting at night in children aged 6 years and above, only when organic causes, such as spina bifida and related disorders, have been excluded and no response has been achieved to all other non-drug and drug treatments, including muscle relaxants and Desmopressin.

Impromood SR should only be prescribed by doctors with expertise in treating patients with persistent bed-wetting.

CONTRAINDICATIONS:

Do not take this drug in these situations:

- if you are allergic to amitriptyline or any of the other ingredients of this medicine.
- if you recently have had a heart attack (myocardial infarction) .
- if you have heart problems such as disturbances in heart rhythm which are seen on an electrocardiogram (ECG), heart block, or coronary artery disease
- if you are taking medicines known as monoamine oxidase inhibitors (MAOIs)
- if you have taken MAOIs within the last 14 days
- if you have taken Moclobemide the day before
- if you have a severe liver disease.

If patient is treated with Impromood SR , you have to stop taking this medicine and wait for 14 days before you start treatment with a MAOI.

This medicine should not be used for children below 6 years of age.

WARNINGS & PRECAUTIONS:

Heart rhythm disorders and hypotension may occur if you receive a high dosage of amitriptyline. This might also occur in usual doses if you have pre-existing heart disease.

Prolonged QT interval :

A heart problem called “prolonged QT interval” (which is shown on your electrocardiogram, ECG) and heart rhythm disorders (rapid or irregular heart beat) have been reported with Amitriptyline.

Tell your doctor if you:

- have slow heart rate.
- have or had a problem where your heart cannot pump the blood round your body as well as it should (a condition called heart failure),
- are taking any other medication that may cause heart problems ,
- have a problem that gives you a low level of potassium or magnesium, or a high level of potassium in your blood
- have a surgery planned as it might be necessary to stop the treatment with amitriptyline before you are given anaesthetics. In the case of acute surgery, the anaesthetist should be informed about the treatment of amitriptyline.
- have an over active thyroid gland or receive thyroid medication.

Thoughts of suicide and worsening of depression:

If you are depressed, you can sometimes have thoughts of harming or killing themselves. These may be increased when first starting antidepressants, since these medicines all take time to work, usually about two weeks but sometimes longer.

You may be more likely to think like this:

- If you have previously had thoughts about killing or harming yourself.
- If you are a young adult. Information from clinical trials has shown an increased risk of suicidal behavior in young adults (less than 25 years old) with psychiatric conditions who were treated with an antidepressant.

Episodes of mania:

Some patients with manic-depressive illness may enter into a manic phase. This is characterized by profuse and rapidly changing ideas, exaggerated gaiety and excessive physical activity. In such cases, it is important to contact your doctor who probably will change your medication.

Tell your doctor if you have, or have had in the past, any medical problems, especially if you have

- narrow angle glaucoma (loss of vision due to abnormally high pressure in the eye)
 - epilepsy, a history of convulsions or fits
 - difficulty in passing urine
 - enlarged prostate
 - thyroid disease
 - bipolar disorder
 - schizophrenia
 - severe liver disease
 - severe heart disease
 - pylorus stenosis (narrowing of the gastric outlet) and paralytic ileus (blocked intestine)
 - diabetes as you might need an adjustment of your anti-diabetic medicine.
- If you use antidepressants such as Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs), your doctor might consider changing the dose of your medicine .

Elderly are more likely to suffer from certain side effects, such as dizziness when you stand up due to low blood pressure.

Children and adolescents:

Depression, neuropathic pain, chronic tension type headache and migraine prophylaxis

laxis : Do not give this medicine to children and adolescents aged below 18 years for these treatments as safety and efficacy have not been established in this age group.

Bed-wetting at night:

- An ECG should be performed prior to initiating therapy with amitriptyline to exclude long QT syndrome.
- This medicines should not be taking at the same time as an anticholinergic drug .
- Suicidal thoughts and behaviours may also develop during early treatment with antidepressants for disorders other than depression; the same precautions observed when treating patients with depression should therefore be followed when treating patients with enuresis

DRUGS INTERACTIONS:

Some medicines may affect the action of other medicines and this can sometimes cause serious side effects.

Tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, such as:

- Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) e.g. Phenelzine, Iproniazid, Isocarboxazid, Nialamide or Tranylcypromine (used to treat depression) or Selegiline (used to treat Parkinson’s disease). These should not be taken at the same time as Amitriptyline
- Adrenaline, Ephedrine, Isoprenaline, Noradrenaline, Phenylephrine and Phenylpropranolamine (these may be present in cough or cold medicine, and in some anaesthetics)
- Medicine to treat high blood pressure for example calcium-channel blockers (e.g. Diltiazem and Verapamil), Guanethidine, Betanidine, Clonidine, Reserpine and Methyldopa
- Anticholinergic drugs such as certain medicines to treat Parkinsons disease and gastro-intestinal disorders (e.g. Atropine, Hyoscyamine)
- Thiuridazine (used to treat schizophrenia)
- Tramadol (painkiller)
- Medicines to treat fungal infections (e.g. Fluconazole, Terbinafine, Ketoconazole, and Itraconazole)
- sedatives (e.g. Babiturates)
- Antidepressants (e.g SSRIs {Fluoxetine, Paroxetine, Fluvoxamine}, and Bupropion)
- Medicines for certain heart conditions (e.g. beta blockers and anti-arrhythmics)
- Cimetidine (used to treat stomach ulcers)
- Methylphenidate (used to treat ADHD)
- Ritonavir (used to treat HIV)
- Oral contraceptives
- Rifampicin (to treat infections)
- Phenytoin and Carbamazepine (used to treat epilepsy)
- St. John’s Wort (hypericum perforatum) – a herbal remedy used for depression
- Thyroid medication.

You should also tell your doctor if you take or have recently taken medicine that may affect the heart’s rhythm. e.g.:

- Medicines to treat irregular heartbeats (e.g. Quinidine and Sotalol)
- Astemizole and Terfenadine (used to treat allergies and hayfever)
- Medicines used to treat some mental illnesses (e.g. Pimozide and Sertindole)
- Cisapride (used to treat certain types of indigestion)
- Halofantrine (used to treat malaria)
- Methadone (used to treat pain and for detoxification)
- Diuretics (“water tablets” e.g. Furosemide)

PREGNANCY AND BREAST-FEEDING:

Amitriptyline is not recommended during pregnancy unless your doctor considers it clearly necessary and only after careful consideration of the benefit and risk. If you have taken this medicine during the last part of the pregnancy, the newborn may have withdrawal symptoms such as irritability, increased muscle tension, tremor, irregular breathing, poor drinking, loud crying, urinary retention, and constipation.

DRIVING AND USING MACHINES:

This medicine may cause drowsiness and dizziness, especially in the beginning of the treatment. Do not drive or work with tools or machinery if you are affected.

DOSE AND ADMINISTRATION:

• Depression:

Adults The recommended initial dose is 50 mg in the evening. Depending on your response to the medicine, your doctor may gradually increase the dose to 150 mg in the evening.

Elderly (above 65 years of age) and patients with cardiovascular disease:The recommended initial dose is 25 mg in the evening. Depending on your response to the medicine, your doctor may increase the dose to 100 mg.

If you receive doses in the range of 100 mg - 150 mg in the evening, your doctor may need to do more frequent follow-up with you.

Use in children and adolescents: This medicine should not be given to children or adolescents for treatment of depression.

• **Neuropathic pain, chronic tension type headache and migraine prophylaxis:** Your doctor will adjust the medication according to your symptoms and your response to the treatment.

Adults :Your doctor will most likely choose to initiate your treatment with Amitriptyline film-coated tablets before starting treatment with Amitriptyline Retard.

The initial dose should be 10 mg - 25 mg in the evening. The recommended doses are 25 - 75 mg in the evening.

Depending on your response to the medicine, your doctor may gradually increase the dose. If you receive doses above 100 mg daily, your doctor may need to do more frequent follow-up with you.



Elderly (above 65 years of age) and patients with cardiovascular disease :A starting dose of 10 mg - 25 mg in the evening is recommended. Depending on your response to the medicine, your doctor may gradually increase the dose.

If you receive doses above 75 mg daily, your doctor may need to do more frequent follow-up with you.

Use in children and adolescents: This medicine should not be given to children or adolescents for treatments of neuropathic pain, chronic tension type headache prophylaxis and migraine prophylaxis.

• Bed-wetting at night :

Use in children and adolescents :The recommended doses for children:

-aged below 6 years: contraindicated.

-aged 6 to 10 years: 10 mg - 20 mg daily. A more suitable dosage form should be used for this age group.

-aged 11 years and above: 25 mg – 50 mg.

The dose should be increased gradually.

Take this medicine 1-1½ hours before bedtime.

Before starting treatment, your doctor will conduct an ECG of your heart to check for sign of unusual heartbeat.

Your doctor will re-evaluate your treatment after 3 months and if needed perform a new ECG.

Do not stop the treatment without consulting your doctor first.

Patients with special risks Patients with liver diseases or people known as “poor metabolisers” usually receive lower doses.

POSSIBLE SIDE EFFECTS:

Very common: sleepiness/drowsiness, shakiness of hands or other body parts, dizziness, headache, irregular/ hard or rapid heartbeat, dizziness when you stand up due to low blood pressure (orthostatic hypotension), dry mouth, constipation, nausea, excessive sweating, weight gain, slurred or slow speech, aggression, congested nose.

Common: confusion, sexual disturbances (decreased sex-drive, problems with erection), disturbance in attention, changes in taste, numbness or tingling in the arms or legs, disturbed coordination, dilated pupils, heart block, fatigue, low sodium concentration in the blood, agitation, urination disorders, feeling thirsty.

Uncommon: excitement, anxiety, difficulties sleeping, nightmares, convulsions, increased blood pressure, diarrhoea, vomiting, skin rash, nettle rash (urticarial), swelling of the face and tongue, difficulties passing urine, increased production of breast milk or breast milk outflow without breast feeding, increased pressure in the eye ball, collapse conditions, worsening of cardiac failure, liver function impairment (e.g. cholestatic liver disease).

OVER DOSAGE:

Symptoms of overdose include: dilated pupils, fast or irregular heartbeats, difficulties passing water, dry mouth and tongue, intestinal blockage, fits, fever, agitation, confusion, hallucinations, uncontrolled movements, low blood pressure, weak pulse, pallor, difficulty breathing, blue discoloration of the skin, decreased heart rate, drowsiness, loss of consciousness, coma, various cardiac symptoms such as heart block, heart failure, hypotension, cardiogenic shock, metabolic acidosis, hypokalemia.

If you forget to take Impromood SR :Take the next dose at the usual time. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

If you stop taking Impromood SR:Your doctor will decide when and how to stop your treatment to avoid any unpleasant symptoms that might occur if it is stopped abruptly (e.g. headache, feeling unwell, sleeplessness and irritability).

STORAGE CONDITIONS: store at room temperature, 15° – 30° C, away from moisture and light.

PACKAGING: 2 Blisters, each contains 10 sustained-release capsules / carton box .

THIS IS A MEDICAMENT	
– A medicament is a product but unlike any other products.	
– A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.	
– Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.	
– Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.	
– Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.	
KEEP MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN	
(Council of Arab Health Ministers)	(Arab Pharmacists Association)

Manufactured by:
HAMA PHARMA Hama - Syria
Tel.: +963 33 8673941 Fax: +963 33 8673943



امبرومود س.ر (كيسول مديد التحرر)

أميتريتيلين هيدروكلورايد ٢٥ ملغ

التركيب و السواغات:

تحتوي كل كبسولة على أميتريتيلين هيدروكلورايد (بشكل حبيبات ممددة التحرر) ٢٥ ملغ .

السواغات : حبيبات .

الاستطباب:

يستطب امبرومود س.ر للحالات التالية :

- الاكتئاب لدى البالغين (نوبات الاكتئاب الكبرى)
- آلام اعتلال الأعصاب لدى البالغين
- الوقاية من صداع التوتر المزمن لدى البالغين
- الوقاية من الصداع النصفي لدى البالغين
- التبول في الفراش ليلاً لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ سنوات وما فوق ، فقط عندما يتم استبعاد الأسباب العضوية ، مثل السنسنة المشقوقة (الشوك المشقوق) والاضطرابات ذات الصلة ، ولم يتم تحقيق أي استجابة للعلاجات الأخرى غير الدوائية والدوائية ، بما في ذلك مخيمات العضلات و دسموبريسين.
- يجب وصف امبرومود س.ر فقط من قبل الأطباء ذوي الخبرة في علاج المرضى الذين يعانون من التبول في الفراش المستمر.

مضادات الأستطباب:

لا يستخدم هذا الدواء في الحالات التالية:

- إذا كان لدى المريض حساسية من أميتريتيلين أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء .
- الاصابة مؤخراً بنوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب).
- المعاناة من مشاكل في القلب مثل الاضطرابات في نظم القلب والتي تظهر على مخطط كهربية القلب (ECG) أو إحصار القلب أو مرض الشريان التاجي.
- إذا كان المريض يتناول مثبطات أكسيداز أحادي الأمين (MAOIs).
- إذا كان المريض قد تناول MAOIs خلال ال ١٤ يوم الماضية
- تناول موكلوبيد في اليوم السابق .
- المعاناة من مرض كبدى شديد.

في حال كان المريض يتناول امبرومود س.ر، يجب التوقف عن تناول هذا الدواء والانتظار لمدة ١٤ يوماً قبل بدء العلاج باستخدام MAOI.

لا ينبغي أن يستخدم هذا الدواء للأطفال دون سن ٦ سنوات.

المحاذير والاحتياطات:

قد تحدث اضطرابات في نظم القلب وانخفاض ضغط الدم في حال تلقي جرعة عالية من أميتريتيلين. قد يحدث هذا أيضاً في الجرعات المعتادة إذا كنت تعاني من أمراض قلبية موجودة مسبقاً.

تطاول الفاصل QT:

تم الإبلاغ عن مشكلة في القلب تسمى «تطاول الفاصل QT» (والتي تظهر على مخطط كهربية القلب ECG) واضطرابات في نظم القلب (ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة) مع الأميتريتيلين.

أخبر طبيبك إذا كنت :

- تعاني من بطء معدل ضربات القلب
- لديك أو واجهت مشكلة حيث لا يستطيع قلبك ضخ الدم حول جسمك كما ينبغي (حالة تسمى فشل القلب)
- تتناول أي دواء آخر قد يسبب مشاكل في القلب
- لديك مشكلة تؤدي إلى مستويات منخفضة من البوتاسيوم أو المغنيزيوم ، أو مستوى عال من البوتاسيوم في الدم.
- التخطيط لعملية جراحية حيث قد يكون من الضروري إيقاف العلاج ب اميتريتيلين قبل أن يتم إعطاؤك أدوية التخدير.
- في حالة الجراحة الحادة ، يجب إبلاغ طبيب التخدير عن العلاج ب اميتريتيلين.
- بحال فرط نشاط الغدة الدرقية أو تلقي أدوية الغدة الدرقية.

الأفكار الانتحارية وتفاقم الاكتئاب:
إذا كنت مكتئباً ، قد يتناكب احياناً أفكار بإيذاء النفس أو الانتحار. يمكن أن يزداد هذا عند بدء استخدام مضادات الاكتئاب لأول مرة ، نظراً لأن هذه الأدوية تستغرق وقتاً طويلاً للعمل ، وعادةً ما يستغرق ذلك أسبوعين تقريباً ولكن أحياناً أطول.

من المرجح أن تتناكب مثل هذه الأفكار بحال :
كان لديك من قبل أفكار حول قتل أو إيذاء نفسك.

كنت شاباً بالغاً حيث أظهرت المعلومات من التجارب السريرية زيادة خطر السلوك الانتحاري لدى الشباب (أقل من ٢٥ عاماً) الذين يعانون من حالات نفسية وقد تم علاجهم بمضادات الاكتئاب.

نوبات الهوس:

قد يدخل بعض المرضى المصابين بمرض الاكتئاب الهوسي في مرحلة الهوس. ويتميز هذا بالأفكار الغزيرة والمتغيرة بسرعة والمرح المبالغ فيه والنشاط البدني المفرط. في مثل هذه الحالات ، من المهم الاتصال بطبيبك الذي من المحتمل أن يغير دوائك.

أخبر طبيبك إذ لديك ، أو كان لديك في الماضي ، أي مشاكل طبية ، وبشكل خاص:

- زرق ضيق الزاوية (فقدان الرؤية بسبب ارتفاع الضغط غير الطبيعي في العين)
- الصرع ، تاريخ من الاختلاجات أو النوبات
- صعوبة في التبول
- غدة بروستات متضخمة
- مرض بالغدة الدرقية
- اضطراب ثنائي القطب
- انقصاب في الشخصية
- أمراض الكبد الشديدة
- أمراض القلب الشديدة
- تضيق البواب (تضيق مخرج المعدة) وعلوص شللي (انسداد الأمعاء).
- داء السكري ، قد تحتاج لتعديل الأدوية المضادة لمرض السكري.
- إذا كنت تستخدم مضادات الاكتئاب مثل مثبطات إعادة التقاط السيروتونين الانتقائية

(SSRIs) ، فقد يفكر طبيبك في تغيير جرعة الدواء .

من المرجح أن يعاني كبار السن من بعض الآثار الجانبية ، مثل الدوخة عند الوقوف بسبب انخفاض ضغط الدم .

الأطفال والمراهقون:

-الاكتئاب ، آلام الأعصاب ، صداع التوتر المزمن والوقاية من الصداع النصفي: لا يعطى هذا الدواء للأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً لهذه العلاجات حيث لم تثبت السلامة والفعالية في هذه الفئة العمرية.

-التبول في الفراش في الليل:

- يجب إجراء تخطيط كهربية القلب قبل بدء العلاج ب أميتريتيلين لاستبعاد متلازمة تطاول الفاصل QT .
- لا ينبغي تناول هذه الأدوية بالتزامن مع دواء مضاد للكولين .
- قد تتطور الأفكار والسلوكيات الانتحارية أيضاً أثناء العلاج المبكر بمضادات الاكتئاب لعلاج الاضطرابات الأخرى غير الاكتئاب ؛ لذلك الاحتياطات التي لوحظت عند علاج مرضى الاكتئاب يجب اتباعها نفسها عند علاج مرضى سلس البول.

التداخلات الدوائية:

قد تؤثر بعض الأدوية على عمل أدوية أخرى وقد يتسبب ذلك أحياناً في آثار جانبية خطيرة.

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أي أدوية أخرى ، مثل:

- مثبطات مونو أمين أوكسيداز (MAOIs) مثل فينيلزين ، إبرونازيد ، إيزوكاربوكسازيد ، نيلاميد أو ترانيلسيبرومين (يستخدم لعلاج الاكتئاب) أو سيليجلين (يستخدم لعلاج مرض باركنسون). لا ينبغي أن تؤخذ بالتزامن مع الأميتريتيلين.
- الأدرينالين والإيفيدرين والإيزوبرينالين والنورادرينالين والفينيل إفرين والفينيل بروبونولامين (قد تكون موجودة في أدوية السعال أو البرد وفي بعض أدوية التخدير).
- أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم على سبيل المثال حاصرات قنوات الكالسيوم (مثل الديلتيازيم والفارلاميل) ، غوانيثيدين ، بيتاندين ، ريزبريين ، الكونديدين وميثيل دوبا.
- الأدوية المضادة للكولين مثل بعض أدوية علاج مرض باركنسون واضطرابات الجهاز الهضمي (مثل الأتروپين ، الهيوسيامين)
- التوبريدازين (يستخدم لعلاج الفصام)
- ترامادول (مسكن للألم)
- أدوية لعلاج الانتانات الفطرية (مثل فلوكونازول ، تريبنافين ، كيتوكونازول ، وإيتراكونازول)
- المهدئات (مثل الباربيتورات)

- مضادات الاكتئاب (مثل SSRIs فلوكستين ، باروكستين ، فلوفوكسامين، والبوروبيون)
- أدوية لبعض أمراض القلب (مثل حاصرات بيتا ومضادات اللائظمية القلبية)
- سيميتيدين (يستخدم لعلاج قرحة المعدة)
- ميثيل فينيدات (يستخدم لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه)
- ريتونافير (يستخدم لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب)
- موانع الحمل الفموية
- ريفامبيسين (لعلاج الانتانات)
- الفينيتوين والكاربامازيبين (يستخدمان لعلاج الصرع)
- عشبة القديس جون- علاج عشبي يستخدم للاكتئاب
- أدوية الغدة الدرقية.

يجب عليك أيضاً إخبار طبيبك إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً دواءً قد يؤثر على نظم القلب .على سبيل المثال:

- أدوية لعلاج عدم انتظام ضربات القلب (مثل الكينيدين والسوتالول)
- أستيميزول وتيرفينادين (يستخدمان لعلاج الحساسية وحى القش)
- الأدوية المستخدمة لعلاج بعض الأمراض العقلية (مثل بيموزيد وسرتيندول)
- سيسيابريد (يستخدم لعلاج أنواع معينة من عسر الهضم)
- هالوفانترين (يستخدم لعلاج الملاريا)
- الميثادون (يستخدم لعلاج الألم وإزالة السموم)
- مدرات البول («أقراص الماء» مثل فوروسيميد)

الحمل والرضاعة:

لا يوصى باستخدام أميتريتيلين أثناء الحمل ما لم يعتبره الطبيب ضروري فقط بعد النظر بعناية في الفائدة والمخاطر. إذا كنت قد تناولت هذا الدواء خلال الجزء الأخير من الحمل ، فقد يعاني المولود من أعراض انسحاب ك التهيج ، زيادة التوتر العضلي ، ارتعاش ، تنفس غير منظم ، سوء الشرب ، البكاء الصاخب ، احتباس البول ، والإمساك.

القيادة واستخدام الآلات:

قد يسبب هذا الدواء النعاس والدوخة ، خاصة في بداية العلاج. لا تقد أو تتعامل مع أدوات أو آلات إذا كنت متأثراً بذلك.

• الاكتئاب:

البالغين: الجرعة الأولية الموصى بها هي ٥٠ ملغ في المساء. اعتماداً على الاستجابة للدواء ، قد يزيد الطبيب الجرعة تدريجياً إلى ١٥٠ ملغ في المساء.

كبار السن (فوق ٦٥ سنة) والمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية: الجرعة الأولية الموصى بها هي ٢٥ ملغ في المساء. اعتماداً على الاستجابة للدواء ، قد يزيد الطبيب الجرعة إلى ١٠٠ ملغ. في حال تلقي جرعات في نطاق ١٠٠ - ١٥٠ ملغ في المساء ، قد يحتاج المريض إلى متابعة أكثر تواتراً.

الاستخدام لدى الأطفال والمراهقين: لا ينبغي إعطاء هذا الدواء للأطفال أو المراهقين لعلاج الاكتئاب.

• آلام الأعصاب وصداع التوتر المزمن والوقاية من الصداع النصفي:

سيقوم الطبيب بتعديل الدواء وفقاً للأعراض والاستجابة للعلاج.

البالغين: سيختار الطبيب على الأرجح بدء العلاج باستخدام أقراص اميتريتيلين المغلفة بالفيلم قبل بدء العلاج باستخدام اميتريتيلين مديد التحرر.

يجب أن تكون الجرعة الأولية ١٠ - ٢٥ ملغ في المساء. الجرعات الموصى بها هي ٢٥ - ٧٥ ملغ في المساء.



اعتماداً على الاستجابة للدواء ، قد يزيد الطبيب الجرعة تدريجياً. في حال تلقي جرعات تزيد عن ١٠٠ ملغ يومياً ، قد يحتاج المريض إلى متابعة أكثر تواتراً.

كبار السن (فوق ٦٥ سنة) والمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية: يوصى بجرعة بداية من ١٠ - ٢٥ ملغ في المساء. اعتماداً على الاستجابة للدواء ، قد يزيد الطبيب الجرعة تدريجياً. في حال تلقي جرعات تزيد عن ٧٥ ملغ يومياً ، فقد يحتاج المريض إلى متابعة أكثر تواتراً.

الاستخدام لدى الأطفال والمراهقين: لا ينبغي إعطاء هذا الدواء للأطفال أو المراهقين لعلاج آلام الأعصاب ، والوقاية من صداع التوتر المزمن والوقاية من الصداع النصفي.

• التبول في الفراش في الليل:

الاستخدام لدى الأطفال والمراهقين: الجرعات الموصى بها للأطفال:

- دون سن ٦ سنوات: مضاد استطباب.
- من ٦ إلى ١٠ سنوات: ١٠ - ٢٠ ملغ يومياً. يجب استخدام شكل جرعة أكثر ملائمة لهذه الفئة العمرية.

- عمر ١١ سنة وما فوق: ٢٥ - ٥٠ ملغ.
يجب زيادة الجرعة تدريجياً.

يؤخذ هذا الدواء قبل نصف ساعة الى ساعة من موعد النوم.

قبل بدء العلاج ، سيقوم الطبيب بإجراء تخطيط القلب للتحقق بحال وجود علامات لدقات قلب غير عادية.

سيقوم الطبيب بإعادة تقييم العلاج بعد ٣ أشهر ، وإذا لزم الأمر ، القيام بإجراء تخطيط قلب جديد.

يجب عدم إيقاف العلاج دون استشارة الطبيب أولاً.

المرضى الذين يعانون من مخاطر خاصة: عادةً ما يتلقى المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد أو الأشخاص المعروف بأنهم «مستقبلون ضعفاء» جرعات أقل.

الآثار الجانبية:

شائعة جداً: نعاس/وسن، ارتعاش اليدين او اي من اجزاء الجسم الاخرى، دوخة، صداع ،ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة ،الدوخة عند الوقوف بسبب انخفاض ضغط الدم (انخفاض ضغط الدم الانتصابي)، جفاف الفم، امساك، غثيان، زيادة التعرق، زيادة الوزن، كلام مشوش أو بطيء، عدوانية، اختقان الانف.

شائعة: ارتباك، اضطرابات جنسية (تناقص الرغبة الجنسية، مشاكل في الانتصاب)،اضطراب في الانتباه، تغيرات في التدفق، خدر أو وخذ في الذراعين او الساقين، اضطرابات في التنسيق، توسع الحدقة، حصار القلب، تعب، انخفاض تركيز الصوديوم في الدم، هياج، اضطرابات في التبول، الشعور بالعطش.

غير شائعة: اثارة، قلق، صعوبة في النوم، كوابيس، اختلاجات، زيادة ضغط الدم، اسهال، اقياء، طفح الجلد، شرى، تورم الوجه و اللسان، صعوبة في مرور البول، زيادة في انتاج الحليب او تدفقه من الثدي دون ارضاع، زيادة الضغط داخل العين، حالات وهط، تفاقم فشل القلب، اعتلال وظيفة الكبد (مثل : أمراض الكبد الركودية).

فرط الجرعة:

تشمل أعراض فرط الجرعة: اتساع حدقة العين، ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة، صعوبات في تمرير الماء، جفاف الفم واللسان، انسداد معوي، نوبات، حصى، هياج، الارتباك، الهلوسة، الحركات غير المنتظمة، انخفاض ضغط الدم وضعف النبض والشحوب، صعوبة في التنفس، تلون الجلد باللون الأزرق، تناقص دقات القلب، نعاس، فقدان الوعي ، غيبوبة، أعراض قلبية متنوعة مثل: حصار القلب، فشل القلب، هبوط ضغط الدم، صدمة قلبية المنشأ، حماض استقلابي، انخفاض بوتاسيوم الدم.

في حال نسيان تناول امبرومود س.ر: يجب تناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد . عدم مضاعفة الجرعة لتعويض الجرعة الفائتة.

في حال التوقف عن تناول امبرومود س.ر: سيقدر الطبيب متى وكيف سيتم إيقاف الدواء لتجنب الاعراض الغير مرغوبة التي قد تحدث عند الايقاف المفاجئ للدواء (ك الصداع، الشعور بعدم الراحة، الارق و التئملل).

شروط الحفظ: يحفظ بدرجة حرارة الغرفة ، ١٥ ° - ٣٠ °مئوية ، بعيداً عن الرطوبة و الضوء.

التعبئة: علبة من الكرتون تحوي بلسر٢ عدد (٢) و كل بلسر٢ يحوي ١٠ كبسولات ممددة التحرر .

إن هذا دواء
<ul style="list-style-type: none">- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات. - الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافًا للتعليمات يعرضك للمخطر. - اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك. فالطبيب والصيدلاني معاً الصيغتان معاً هما الدواء ونفعه وضرره. - لا تلتقط عبوة العلاج الجديدة من رفكأه وتساك. - لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
(لمجلس وزراء الصحة المصري) <p>تألفت الأدوية أبدأ في متناول ايدي الأطفال</p> <p>(الصحة الصيغالبسة المصري)</p>

إتساح:

حماة فارما حماة – سويرة

هاتف: ٩٦٢٣ ٢٢ ٨١٧٢٩٤١ +
فاكس: ٩٦٢٣ ٢٢ ٨١٧٢٩٤٢ +
٩٦٢٣ ٢٢ ٨١٧٢٩٤١ +

HAMA PHARMA

