

Terpopheren (Tablets)

Phenylephrine HCl/Tripolidine HCl 5/2.5 mg



COMPOSITION AND EXCIPIENTS:

Each tablet of Terpopheren contains:

Phenylephrine HCl 5 mg

Tripolidine HCl 2.5 mg

Excipients:

Lactose, Corn starch, Povidone, Magnesium Stearate.

INDICATIONS:

Temporarily relieves these symptoms due to common cold, hay fever (allergic rhinitis) or other upper Respiratory allergies:

- Runny nose.
- Sneezing.
- Itching of the nose or throat.
- Itchy, watery eyes.
- Nasal congestion.
- Reduces swelling of nasal passages.

WARNINGS:

Do not exceed recommended dosage.

Do not use this product :

• If you are now taking a prescription monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (certain drugs for depression, psychiatric, or emotional conditions, or Parkinson's disease), or for 2 weeks after stopping the MAOI drug. If you do not know if your prescription drug contains an MAOI, ask a doctor or pharmacist before giving this product.

Ask a doctor before use if you have:

- a breathing problem such as emphysema or chronic bronchitis.
- heart disease.
- high blood pressure.
- thyroid disease.
- Diabetes.
- Glaucoma.
- trouble urinating due to an enlarged prostate gland.

Ask a doctor before use if you are taking sedatives or tranquilizers.

When using this product :

- excitability may occur, especially in children.
- may cause drowsiness.
- alcohol, sedatives and tranquilizers may increase the drowsiness effect.
- avoid alcoholic beverages.

• use caution when driving a motor vehicle or operating machinery.

Stop use and ask a doctor if :

- nervousness, dizziness, or sleeplessness occur.
- cough or nasal congestion persists for more than 1 week, tends to recur or is accompanied by a fever, rash or persistent headache. These could be signs of a serious condition.
- new symptoms occur.

Pregnancy and lactation: If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use.

Overdose: In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Do not exceed 5 days of treatment.

Adults and Children 12 years of age and older:

1 tablet every 4 hours, not to exceed 4 dosages in 24 hours, or as directed by a doctor

STORAGE CONDITIONS:

Store at room temperature, below 25° C, away from light and moisture.

PACKAGING:

2 blisters, each contains 10 tablets/carton box.

THIS IS A MEDICAMENT

- A medicament is a product but unlike any other products.
- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

KEEP MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN

(Council of Arab Health Ministers)

(Arab Pharmacists Association)

Manufactured by:
HAMA PHARMA Hama - Syria
Tel.: +963 33 8673941 Fax: +963 33 8673943





التركيب و السواغات:

تحتوي كل مضغوطة من تيربوفيرين على:

فينيل إفرين هيدروكلوريد ٥ ملغ

تيربوليدين هيدروكلوريد ٥,٢ ملغ

السواغات:

لاكتوز، نشاء الذرة، بوفيدون، شمعات المغنيزيوم.

الاستنباطات:

يخفف مؤقتاً الأعراض الناتجة عن نزلات البرد، حمى

القش (التهاب الأنف التحسسي) أو غيرها من حساسية

الجهاز التنفسي العلوي:

• سيلان الأنف.

• العطاس.

• حكة الأنف أو الحلق.

• العين الدامعة، حكة.

• احتقان الأنف.

• يقلل من تورم القنوات الأنفية.

التحذيرات:

لا تزيد الجرعة الموصوفة.

لا تستخدم هذا الدواء:

• إذا كنت تتناول مثبطات منو أمين أو كسيداتاز (MAOI)

(أدوية تستخدم لتدبير الاكتئاب والحالات النفسية أو العاطفية،

أو مرض باركنسون)، أو لبعد أسبوعين من التوقف عن

تناول أدوية (MAOI). إذا كنت لا تعرف ما إذا كنت

أدويةك تحتوي على (MAOI) ، اسأل الطبيب أو الصيدلي

قبل أخذ الدواء.

اسأل الطبيب قبل الاستعمال إذا كان لديك:

• مشاكل في التنفس مثل انتفاخ الرئة أو التهاب الشعب

الهوائية المزمن.

• أمراض القلب.

• ارتفاع ضغط الدم.

• مرض الغدة الدرقية.

• داء السكري.

• زرق (ارتفاع ضغط العين).

• مشاكل في التبول بسبب تضخم غدة البروستات.

اسأل الطبيب قبل الاستعمال إذا كنت تتناول مسكنات أو

مهدئات.

عندما يستخدم هذا الدواء:

• قد يحدث هتياج، وخاصة عند الأطفال.

• قد يسبب النعاس.

• قد يزيد الكحول، المسكنات والمهدئات من تأثير النعاس.

• تجنب المشروبات الكحولية.

• توخي الحذر عند قيادة السيارة أو تشغيل الآلات.

يقاف الدواء واستشارة الطبيب إذا:

• حدث اضطراب، دوار، أو أرق.

• استمر السعال أو احتقان الأنف لأكثر من ١ أسبوع، يميل

إلى التكرار أو يرافقه حمى، طفح جلدي أو صداع مستمر.

يمكن أن تكون هذه علامات على حالة خطيرة.

• حدوث أعراض جديدة.

الحمل والإرضاع: إذا كنت حاملاً أو مرضعة، استشيري

اختصاصي الصحة قبل الاستعمال.

فطر الجرعة: في حالة فطر الجرعة، حصل على

المساعدة الطبية أو اتصل بالمركز الطبي حالاً.

الجرعة وطريقة الاستخدام:

لا تزيد مدة العلاج عن ٥ أيام.

البالغين والأطفال فوق ١٢ سنة من العمر:

قرص كل ٤ ساعات، لا تزيد عن ٤ جرعات في ٢٤ ساعة،

أو حسب توجيهات الطبيب.

شروط الحفظ:

يحفظ في درجة حرارة الغرفة، دون الدرجة ٢٥ °م، بعيداً

عن الضوء والرطوبة.

التعبئة:

علبة من الكرتون تحوي بليستر عدد (٢)، وكل بليستر

يحتوي ١٠ مضغوطات.

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يوتر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب ومطابقة الاستعمال المخصوص عليها، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك، فاطمئنين وأصحاء لأنهما الجديران بالدواء ونفعه وضرره.
- لا تشفع مدة العلاج المحددة من لثقاءم نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.

لاتترك الأدوية أبداً في متناول أيدي الأطفال

(مجلس وزراء الصحة العربي - النجدة الصيدلانية العربي)

